

## Instrucciones Postoperatorias de Sedación

Gracias por confiarnos la atención dental de su hijo. No dude en llamar a nuestra oficina si tiene alguna pregunta o inquietud. Siempre estamos aquí para ayudar de cualquier forma posible.

- La medicación sedante provoca relajación y deterioro de los reflejos normales. Aunque su hijo ha sido evaluado y autorizado para salir de la oficina, **es imperativo que sea monitoreado el resto del día**. El medicamento permanecerá en el sistema de su hijo hasta por 8 horas.
- Mientras conduce a casa, asegúrese de que la cabeza de su hijo permanezca erguida y no se mueva ni se caiga hacia un lado. La barbilla nunca debe tocar los hombros o el pecho.
- **Hoy no hay clases** ; debería considerarlo un día de enfermedad. Debe evitarse jugar al aire libre. La actividad es rigurosa como en bicicletas, patinetas, camas elásticas, etc. es especialmente peligrosa, incluso si su hijo parece estar actuando con normalidad.
- Se espera una siesta. Su hijo está más seguro durmiendo de lado. Asegúrese de que su hijo descance en una posición cómoda y natural con la cabeza y el cuello rectos.
- Durante el resto del día, su hijo debe comer alimentos ligeros (sándwich, sopa, fruta, etc.) Los alimentos pesados (pizza, hamburguesas, lasaña, etc.) pueden causar malestar estomacal. Asegúrese de que su hijo se mantenga bien hidratado.
- El área del tratamiento estará adormecida durante 30 minutos hasta incluso 2 o 3 horas después del tratamiento. Observe a su hijo para asegurarse de que no muerda, chupe ni frote el área (incluida la lengua). La experiencia de entumecimiento difiere de un niño a otro y pueden quejarse de sentirse "gordos" o "raros" o incluso "doloridos"; esto es completamente normal.
- **Consulte con nuestra oficina antes de administrar cualquier medicamento que no sea Tylenol o Ibuprofeno.**



Office #:  
432-699-2044  
Emergencia #:  
432-638-9525

## Instrucciones Postoperatorias de Sedación

Gracias por confiarnos la atención dental de su hijo. No dude en llamar a nuestra oficina si tiene alguna pregunta o inquietud. Siempre estamos aquí para ayudar de cualquier forma posible.

- La medicación sedante provoca relajación y deterioro de los reflejos normales. Aunque su hijo ha sido evaluado y autorizado para salir de la oficina, **es imperativo que sea monitoreado el resto del día**. El medicamento permanecerá en el sistema de su hijo hasta por 8 horas.
- Mientras conduce a casa, asegúrese de que la cabeza de su hijo permanezca erguida y no se mueva ni se caiga hacia un lado. La barbilla nunca debe tocar los hombros o el pecho.
- **Hoy no hay clases** ; debería considerarlo un día de enfermedad. Debe evitarse jugar al aire libre. La actividad es rigurosa como en bicicletas, patinetas, camas elásticas, etc. es especialmente peligrosa, incluso si su hijo parece estar actuando con normalidad.
- Se espera una siesta. Su hijo está más seguro durmiendo de lado. Asegúrese de que su hijo descance en una posición cómoda y natural con la cabeza y el cuello rectos.
- Durante el resto del día, su hijo debe comer alimentos ligeros (sándwich, sopa, fruta, etc.) Los alimentos pesados (pizza, hamburguesas, lasaña, etc.) pueden causar malestar estomacal. Asegúrese de que su hijo se mantenga bien hidratado.
- El área del tratamiento estará adormecida durante 30 minutos hasta incluso 2 o 3 horas después del tratamiento. Observe a su hijo para asegurarse de que no muerda, chupe ni frote el área (incluida la lengua). La experiencia de entumecimiento difiere de un niño a otro y pueden quejarse de sentirse "gordos" o "raros" o incluso "doloridos"; esto es completamente normal.
- **Consulte con nuestra oficina antes de administrar cualquier medicamento que no sea Tylenol o Ibuprofeno.**



Office #:  
432-699-2044  
Emergencia #:  
432-638-9525